Notices bibliographiques

Notices bibliographiques issues de
la Bibliographie Géographique Internationale
(base FRANCIS) pour la requête « Guyane française »

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/echogeo/7353>
DOI : 10.4000/echogeo.7353
ISSN : 1963-1197

Éditeur

Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (CNRS UMR 8586)

Référence électronique

« Notices bibliographiques », *EchoGéo* [En ligne], 6 | 2008, mis en ligne le 25 septembre 2008, consulté le 31 juillet 2021. URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/7353> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/echogeo.7353>

Ce document a été généré automatiquement le 31 juillet 2021.

EchoGéo est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND)

Notices bibliographiques

Notices bibliographiques issues de
la Bibliographie Géographique Internationale
(base FRANCIS) pour la requête « Guyane française »

NOTE DE L'ÉDITEUR

Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.

- 1 Légende des zones des références bibliographiques
 - 2 **FT** : Titre en français, **ET** : Titre en anglais, **ST** : Titre en espagnol, **GT** : Titre en allemand, **OT** : Titre, **AU** : Auteur, **DT** : Type de document (Thèse, Congrès), **SO** : Source, **FA** : Résumé en français, **EA** : Résumé en anglais, **FD** : Mots-clés français
-

BIBLIOGRAPHIE

FT : Les limites du modèle communal français en Guyane : le cas de Maripasoula

AU : BASSARGETTE (D.); DI MÉO (G.)

SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2008; Vol. 61; No. 241-242; Pp. 49-80; Abs. français/anglais; Bibl. 2 ref.; fig., 7 phot.

FA : L'outil de formation socio-spatiale sert à tester la validité du modèle communal à Maripasoula (Guyane française). Milieu enclavé, la masse de la forêt et le fleuve Maroni sont constamment présents dans la vie quotidienne. Les rapports socio-spatiaux des ethnies ont varié et les notions d'État, de frontières, de légalité républicaine se dissolvent. Seule fonctionne un peu une instance politique. Quel développement citoyen peut-on imaginer ? - (OC)

FD : Enclavement; Commune; Territoire; Pouvoir; Pouvoir politique; Etat; Administration; Ethnie;

Collectivité territoriale; Administration locale; Aménagement du territoire; Guyane française; Saint-Laurent-du-Maroni; Maripasoula

FT : L'agriculture itinérante sur brûlis en Guyane française : la fin des durabilités écologique et socioculturelle ?

AU : DEMAIZE (M.T.); MANUSSET (S.)

SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2008; Vol. 6 ; No. 241-242; Pp. 31-48; Abs. français/anglais; Bibl. 30 ref.; 3 fig., 4 tabl., 6 phot.

FA : Un point est fait sur l'agriculture itinérante sur brûlis et les modifications en Guyane française à partir de la bibliographie existante et d'enquêtes effectuées sur le terrain entre 1998 et 2006. Cette pratique agricole traditionnelle tient une place importante sur les plans social, culturel, écologique et alimentaire (autoconsommation). - (OC)

FD : Agriculture de subsistance; Agriculture traditionnelle; Culture itinérante; Pratique culturelle; Défrichement; Déboisement; Zone intertropicale; Forêt; Forêt tropicale; Culture sur brûlis; Identité culturelle; Développement durable; Guyane française

FT : Potentiel des radars satellitaires embarqués sur ENVISAT et ERS pour le suivi et la cartographie de la dynamique côtière au large de Kourou (Guyane française)

AU : KOUAMÉ (J.); CLASSEAU (N.); RUDANT (J.-P.); MASCRET (A.); TREBOSEN (H.)

SO : Photo interprétation (Paris); ISSN 0031-8523; France; Da. 2007; Vol. 43; No. 1; 3-16; 35-40; Abs. français/anglais; Bibl. 28 ref.; 6 fig., 3 tabl., 6 pl.coul.

FA : Les AA. présentent les résultats de l'étude multitemporelle menée en Guyane française sur la contribution de la série d'images radar ERS et ENVISAT-ASAR pour l'étude de la dynamique du littoral à proximité de Kourou. L'analyse diachronique et l'interprétation de 3 types d'images radar acquises en 1992, 1999 et 2002, à de faibles hauteurs de marée ont permis la comparaison des états successifs de la frange côtière et la cartographie de la dynamique côtière : important déplacement nord-ouest des bancs de vase; colonisation par les mangroves jeunes des dépôts de bancs de vase; forte dégradation des mangroves près de Kourou

FD : Photo-interprétation; Image radar; ERS; ENVISAT-ASAR; Littoral; Dynamique littorale; Transport sédimentaire; Envasement; Mangrove; Guyane française; Kourou

ET : Intertidal subsidence and collapse features on wave-exposed, drift-aligned sandy beaches subject to Amazon mud: Cayenne, French Guiana

AU : ANTHONY (E.J.); DOLIQUE (F.)

SO : Earth surface processes and landforms; ISSN 0197-9337; Royaume-Uni; Da. 2006; Vol. 31; No. 8; Pp. 1051-1057; Abs. anglais; Bibl. 4 ref.; 5 fig.

EA : This paper briefly reports on the conditions and processes involved in such deformation features, which reflect active mud burial under sand within the intertidal beach profile

FD: Littoral; Plage; Sable; Boue; Zone intertidale; Mouvement de masse; Géomorphodynamique; Guyane française

FT : Apport de l'imagerie spatiale optique et radar pour la cartographie des bancs de vase en Guyane Française

AU : BAGHDADI (N.); DAVID (A.); OLIVEROS (C.); GRATIOT (N.)

SO : Bulletin des sciences géographiques; ISSN 1112-3745; Algérie; Da. 2005; No. 16; Pp. 47-64; Abs. français/anglais; Bibl. 12 ref.; 17 fig., 2 tabl.

FA : Le but de cette étude est de tester le potentiel des images RADARSAT, en relation avec les images optiques SPOT et LANDSAT, pour la détection et la cartographie des bancs de vase. Des images acquises en 2002 et 2003 ont été étudiées pour des paramètres d'acquisition et des conditions de marée variables. Les images radar ont été comparées aux images optiques et aux données bathymétriques. Les résultats montrent l'apport des outils de télédétection pour la cartographie des bancs de vase

FD : Télédétection; Image satellite; Image radar; Bathymétrie; Cartographie thématique; Vase; Zone intertidale; Etude comparée; Guyane française

FT : Apport de l'imagerie spatiale optique et radar pour la détection et le suivi des zones d'orpaillage en Guyane Française

AU : BAGHDADI (N.); BOURGUIGNON (A.); LASSERRE (J.L.)

SO : Bulletin des sciences géographiques; ISSN 1112-3745; Algérie; Da. 2005; No. 16; Pp. 36-46; Abs. français/anglais; Bibl. 4 ref.; 11 fig.

FA : Le but de cette étude est d'analyser le potentiel de l'imagerie radar issue des capteurs RADARSAT et SIRC et de l'imagerie optique issue de SPOT et LANDSAT pour la détection et la cartographie des zones d'orpaillage. Le couplage de l'imagerie avec la carte des permis miniers permet de montrer la possibilité de réaliser un contrôle de l'activité (cartographie des exploitations clandestines; contrôle de l'activité légale). L'étude, réalisée sur des images acquises entre 1990 et 2003, montre que les capteurs optiques constituent le meilleur outil pour la cartographie de cette activité

FD : Télédétection; Image satellite; SPOT; LANDSAT; Exploitation minière; Cartographie thématique; Or; Image radar; Etude comparée; Guyane française

FT : Le chemin de Léon Damas, sur les traces de la Tortue. Vers une géographie "vernaculaire" de la Guyane ?

AU : LÉZY (E.); COLLIGNON (B.)

SO : Géographies. Bulletin de l'Association de géographes français; ISSN 0004-5322; France; Da. 2005; Vol. 82; No. 3; Pp. 358-380; Abs.français/anglais; Bibl. 21 ref.; 6 fig.

FA : A partir des textes de L. Damas, vecteur simultané d'une vision "officielle" et "indigène" de la Guyane, on peut faire apparaître certains principes de constructions propres à cette approche et certaines formes caractéristiques de la région. Ils ne peuvent être retranchés d'un savoir géographique "universel" pour fonder une sphère autonome. Leur universalité, leur capacité à décrire les dimensions du monde peu abordées par la géographie européenne, indiquent au contraire qu'il s'agit d'un apport essentiel à la perception de la forme du monde et à la compréhension de la place de l'Homme en son sein

FD : Perception; Savoir vernaculaire; Image; Voyage; Colonisation; Identité; Société; Guyane française

ET : Peaceful relations in a stateless region : the post-war Maroni river borders in the Guianas

AU : KRUIJT (D.); HOOGBERGEN (W.)

SO : Tijdschrift voor economische en sociale geografie; ISSN 0040-747X; Pays-Bas; Da. 2005; Vol. 96; No. 2; Pp. 199-208; Abs. anglais ; Bibl. 22 ref.

FA : A la suite de la guerre civile du Suriname, la nouvelle structure politique de la région est le produit d'une faillite partielle de l'Etat. Elle ne s'accompagne pas de phénomènes de violence extrêmes. On assiste à une co-existence multiculturelle relativement paisible. Les auteurs des troubles se sont éloignés de la région. L'économie de l'or (informelle) et l'afflux de "garimpos" brésiliens apportent une prospérité de court terme

FD : Rôle de l'Etat; Géographie politique; Conflit; Migration; Economie souterraine; Ethnie; Guerre civile; Démocratie; Multiculturalisme; Société; Suriname; Guyane française

FT : Caractères généraux des mangroves de la Guyane française : comparaison avec les mangroves malgaches

AU : BATTISTINI (R.)

SO : Cahiers nantais ; ISSN 0767-8436; France; Da. 2003; No. 59; Pp. 131-138; Abs. français/anglais; Bibl. 19 ref.; 4 fig.

FA : La forêt de palétuviers forme un ruban presque continu le long de la côte de la Guyane

française. Alors qu'à Madagascar la mangrove occupe un plan doucement incliné et continu depuis le niveau des hautes mers moyennes, et présente une véritable zonation des espèces, en Guyane le "siriubal" couvre l'équivalent d'un haut schorre sub-horizontale. Cette différence serait due à la rapidité en Guyane du remblaiement de tout espace fixé par la végétation, jusqu'à un niveau voisin de celui des hautes mers moyennes. Pour cette raison, le réseau complexe et hiérarchisé de chenaux secondaires, habituel dans les mangroves malgaches, n'y est pas observé

FD : Littoral; Mangrove; Dynamique des populations; Colonisation végétale; Zonation; Etude comparée; Ecosystème; Guyane française; Madagascar

ET : Short-term changes in the plan shape of a sandy beach in response to sheltering by a nearshore mud bank, Cayenne, French Guiana

AU : ANTHONY (E.J.); GARDEL (A.); DOLIQUE (F.); GUIRAL (D.)

SO : Earth surface processes and landforms; ISSN 0197-9337; Royaume-Uni; Da. 2002; Vol. 27; No. 8; Pp. 857-866; Abs. anglais; Bibl. 11 ref.; 5 fig.

EA : Monjoly is a headland-bound embayed sandy beach in Cayenne that shows long-term plan shape equilibrium in spite of periodic changes in accretion and erosion that alternately affect either end of the beach. These changes are caused by mud banks that move alongshore from the Amazon. The mechanisms involved in changes in the plan shape of the beach in response to the passage of one of these mud banks were monitored between 1997 and 2000 from airborne video imagery and field work

FD : Littoral; Plage; Transport sédimentaire; Télédétection; SPOT; Photographie aérienne; Dynamique littorale; Sable; Boue; Ligne de rivage; Guyane française; Cayenne

FT : Caractérisation et suivi de la déforestation en milieu tropical par télédétection. Application aux défrichements agricoles en Guyane française et au Brésil

AU : TSAYEM DEMAZE (M.); FOTSING (J.-M.); POLIDORI (L.)

SO : Caractérisation et suivi de la déforestation en milieu tropical par télédétection. Application aux défrichements agricoles en Guyane française et au Brésil; France; Da. 2002; 242 p.

FA : L'A. caractérise et suit l'évolution des défrichements agricoles en forêt amazonienne en utilisant les données de télédétection. Exemple des abattis en Guyane française et des fronts pionniers au Brésil. Ces modes de colonisation agricole relèvent de logiques différentes. Les fronts pionniers émanent d'une volonté de mise en valeur organisée de la forêt, mais ils essaient par la suite. Les abattis, spontanés et itinérants, se multiplient souvent de manière non planifiée, et leur statut foncier est précaire. L'exploitation des images est menée alternativement avec l'analyse des données socio-économiques, ce qui débouche sur une proposition de veille aérospatiale pour la surveillance et la gestion de la forêt.

FD : Forêt; Forêt tropicale; Déboisement; Défrichement; Front pionnier; Agriculture sur brûlis; Occupation du sol; Télédétection; Système d'information géographique; Analyse d'image; Amazonie; Guyane française; Brésil

FT : Pertinence de la notion d'indicateur pour la caractérisation du bassin-versant

AU : GAUCHEREL (C.)

SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; France; Da. 2003; vol. 32; No. 3; Pp. 265-281; Abs. français/anglais; Bibl. 63 ref.; 6 fig., 2 tabl.

FA : Cet article traite essentiellement de la caractérisation physique (hydrographique, géomorphologique...) et notamment spatiale des différentes composantes du bassin versant. Cette démarche profite à plusieurs applications, de la modélisation hydrologique à la comparaison, en passant par des études de prévisions d'inondations ou de surveillance de la qualité des eaux. L'A. en présente l'exemple avec la comparaison des particularités spatiales des principaux bassins-versants de la Guyane française. Il propose aussi de nouveaux indicateurs spatiaux (distribués) et globaux (statistiques), obtenus à partir de données de télédétection

FD : Bassin-versant; Hydrologie; Indicateur; Modèle; Télédétection; Réseau de drainage; Classification; Concept; Guyane française

FT : La question du patrimoine historique dans le développement en Guyane : le cas de Saint-Laurent du Maroni

AU : CALMONT (A.); COSAERT (P.); BART (F.)

SO : Collection Espaces tropicaux; ISSN 1147-3991; France; Da. 2003; No. 18; Pp. 481-492; Abs. français/anglais; Bibl. 5 ref.; 2 fig., 1 phot.

FA : Créée par et pour le bagne, Saint-Laurent du Maroni a hérité d'un important patrimoine architectural pénitenciaire. Ces ressources sont aujourd'hui revendiquées et font l'objet d'une préservation et d'une revalorisation, développement impulsé par le processus de patrimonialisation (enjeux culturels, urbanistiques et économiques). - (OC)

FD : Patrimoine architectural; Patrimoine culturel; Bagne; Petite ville; Aménagement urbain; Tourisme; Protection des sites; Ville; Guyane française; Saint-Laurent du Maroni

FT : Le futur Parc de la forêt tropicale guyanaise : une opportunité pour repenser la relation spatiale entre une organisation et son substrat

AU : BASSARGETTE (D.)

SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2003; Vol. 112; No. 630; Pp. 188-213; Abs. français/anglais; Bibl. 9 ref.; 3 fig., 5 tabl., 1 phot.

FA : L'A. propose de renouveler le regard porté sur les parcs et leur substrat, car la réussite du futur parc de la Guyane exige la participation active des communautés résidentes. Accordant plus d'attention aux pratiques et aux représentations existantes, le parc doit forger sa propre territorialité, basée sur la mise en place de lieux. Ces lieux, centres de ressources, de rencontres et de débats, permettent l'émergence d'un nouvel espace public. Fonctionnant en réseau, ils libéreront le parc du centralisme traditionnel et s'ouvriront plus facilement aux dynamiques locales et régionales

FD : Forêt tropicale; Parc naturel; Lieu; Territorialité; Collectivité locale; Participation; Gestion; Protection de la nature; Guyane française

FT : Recharge d'une retenue hydroélectrique stratifiée tropicale après orage (Retenue de Petit Saut, Guyane Française)

AU : CHARLET (L.); PERETYASHKO (T.); ASTRADE (L.)

SO : Revue de géographie alpine; ISSN 0035-1121; France; Da. 2003; Vol. 91; No. 1; Pp. 93-99; Abs. français/anglais; Bibl. 4 ref.; 4 fig.

FA : Sur la base des profils de température, de pH et de teneur en oxygène, une stratification du lac est clairement observée en saison sèche, tant au centre du lac que dans ses branches latérales. En saison humide, la stratification est beaucoup moins nette, et le calcul des coefficients de diffusion indique la présence de turbulence dans la zone profonde du lac. Dans une branche latérale de la retenue, le suivi du profil de teneur en oxygène des eaux en fonction de la profondeur, avant et après un épisode orageux, a permis de démontrer que la recharge du lac ne se faisait pas par l'épilimnion. Mise en évidence d'une ré-oxygénation très lente des eaux de telles retenues hydroélectriques

FD : Lac; Lac de barrage; Qualité de l'eau; Biogéochimie; Zone intertropicale; Orage; Stratification des eaux; Modèle; Oxygène; Recharge naturelle; Guyane française

FT : La protection des mangroves dans les départements français d'Amérique : enjeux spatiaux et patrimoniaux. L'exemple du Conservatoire du littoral et de quelques-uns de ses partenaires

AU : KLEIN (J.)

SO : La Géographie : acta geographica; ISSN 1627-4911; France; Da. 2001; Vol. 173; No. 1501; Pp. 22-43; Abs. français/anglais; Bibl. 35 ref.; 3 fig., 2 phot.

FA : Les mangroves couvrent plus de 80% du linéaire côtier en Guyane, où l'anthropisation ne les menace pas. Leur extension est beaucoup plus réduite dans les Antilles françaises, où elles sont soumises à d'importantes pressions. La politique du Conservatoire du littoral dans les DOM tient compte de ces contrastes et accompagne la transformation des regards sur un milieu longtemps jugé hostile, aujourd'hui élément de patrimonialisation.

FD : Mangrove; Protection du littoral; Perception; Mise en valeur; Gestion de l'environnement; Tourisme; Littoral; Guyane française; Guadeloupe; Martinique

FT : La déforestation dans la région de Saint-Georges de l'Oyapock (Guyane française)

AU : TSAYEM DEMAZE (M.); FOTSING (J.-M.); HUYNH (F.)

SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2002; Vol. 55; No. 218; Pp. 197-222; Abs. français/anglais; Bibl. 44 ref.; 6 fig., 5 tabl., 2 phot.

FA : Evaluation de l'emprise spatiale de l'agriculture itinérante sur brûlis et suivie des mutations récentes dans l'occupation du sol à l'échelle locale dans la région de Saint-Georges de l'Oyapock à partir de 3 séries de photographies aériennes à échelle et dates différentes. - (OC)

FD : Culture sur brûlis; Défrichement; Déboisement; Dynamique de la végétation; Utilisation du sol; Photographie aérienne; Système d'information géographique; Agriculture de subsistance; Guyane française

FT : Les paysages urbains de l'île de Cayenne, Guyane française

AU : GARDEL (A.)

SO : Mappemonde; ISSN 0764-3470; France; Da. 2001; No 63; Pp 16-21; Abs. français/anglais/espagnol; Bibl. 5 ref.; 4 fig., 10 phot.

FA : L'urbanisation de l'île de Cayenne revêt des formes inattendues pour un département français. Un milieu contraignant, une mosaïque de populations, de conditions socio-économiques très inégales, ont façonné un paysage urbain très hétérogène. Les conséquences d'une urbanisation désordonnée sont nombreuses et génériques à de nombreuses villes des pays du Sud

FD : Paysage urbain; Urbanisation; Habitat urbain; Habitat spontané; Aménagement urbain; Guyane française; Cayenne

FT : Montagnes mythiques : les Tumuc-Humac

AU : HURAUULT (J.)

SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834; France; Da. 2000; Vol. 53; No. 212; Pp. 367-392; Abs. français/anglais; Bibl. 9 ref.; 13 fig., 2 annexes

FA : Naissance et permanence de l'appellation des montagnes mythiques franco-brésiliennes Tumuc-Humac de 1656 à nos jours. - (OC)

FD : Montagne; Mythe; Perception; Géographie historique; Guyane française

FT : SIG et cartographie de l'occupation du sol : l'exemple de Saint-Georges de l'Oyapock en Guyane française

AU : TSAYEM (M.)

SO : Science et changements planétaires. Sécheresse; ISSN 1147-7806; France; Da. 1999; Vol. 10; No. 4; Pp. 289-295; Abs. français/anglais; Bibl. 10 ref.; 6 fig., 2 tabl., 1 phot.

FA : Cartographie réalisée par photo-interprétation assistée par ordinateur, complétée par des relevés effectués sur le terrain. Les abattis, une des multiples variantes de l'agriculture itinérante sur brûlis, n'occupent qu'une petite portion de l'espace et sont localisés essentiellement entre 40 et 50 m, de part et d'autre des voies de circulation et dans un périmètre de 2 km à l'ouest du bourg. - (JPB)

FD : Utilisation du sol; Carte thématique; Photo-interprétation; Système d'information géographique; Abattis; Guyane française; Saint-Georges de l'Oyapock

FT : Télédétection radar des mangroves de Guyane française

AU : PROISY (C.); MOUGIN (E.); FROMARD (F.); RUDANT (J.P.); VINÉ (P.)

SO : Photo interprétation (Paris); ISSN 0031-8523; France; Da. 1998; Vol. 36; No. 1; 79, 81-88; Abs. français/anglais/espagnol; Bibl. 5 ref.; 5 fig., 1 tabl., 1 comp.coul.

FA : Les AA. analysent les réponses radar en multi-fréquences et en multi-polarisations des mangroves de Guyane Française. Il s'agit d'abord de déterminer les meilleures configurations radar pour discriminer les mangroves vis-à-vis de quelques formations végétales tropicales. Les relations entre les paramètres forestiers de la mangrove (hauteurs, diamètres, densités, biomasses aériennes) et les données radar sont ensuite examinées. Des modèles simples pour l'estimation de ces paramètres sont proposés

FD : Télédétection; Végétation; Zone intertropicale; Mangrove; Littoral; Ecosystème; Biomasse; Dynamique de la végétation; Radar; Traitement des données; Guyane française

FT : L'association des Etats de la Caraïbe dans les processus d'intégration régionale. Quelle insertion pour les Départements Français d'Amérique ?

AU : TAGLIONI (F.); VAN EEUWEN (D.)

SO : Annales d'Amérique latine et des Caraïbes; France; Da. 1997; No. 14-15; Pp. 147-167; Bibl. 17 ref.; 1 fig., 2 tabl.

FA : La récente association des Etats de la Caraïbe apparaît comme un espace charnière entre l'ALENA et les autres regroupements régionaux d'Amérique latine. Elle rassemble 25 pays, une population de 223 millions d'individus qui la place au quatrième rang des zones économiques régionales du monde alors que son potentiel économique la situe au cinquième rang mondial. Cette association a vu le jour dans un environnement économique et politique en mutations rapides pour les Etats et territoires du bassin caraïbe. L'étude de ses objectifs et de ses modalités de fonctionnement éclaire sur sa potentialité en tant que nouvelle donne économique pour la région caraïbe

FD : Organisation; Coopération régionale; Etat; Ile; Intégration économique; Stratégie de développement; Association; Monde; Monde caraïbe; Guadeloupe; Martinique; Guyane française; Développement régional

FT : Santé et géographie en Guyane

AU : BOURGAREL (S.)

SO : Santé et géographie en Guyane; France; Paris: L'Harmattan; Da. 1994; Pp. 239 p.; ISBN 2-7384-2896-7

FA : En Guyane, la combinaison d'un milieu tropical humide et d'un système de soins bénéficiant d'importants moyens financiers est réalisée. La géographie de la santé permet une approche originale et pertinente. L'histoire de cette région explique la faible maîtrise de l'espace. La faible présence humaine facilite la prégnance de certaines maladies. La Guyane est étudiée à trois échelles, qui chacune s'emboîtent et affinent la vision globale de départ: régionale, intra-départementale puis urbaine

FD : Santé; Transition démographique; Epidémiologie; Maladie; Pathologie régionale; Paludisme; Démographie; Cause de décès; Disparités, régionales; Mortalité; Morbidité; Ségrégation urbaine; Inégalité sociale; Ecologie urbaine; Guyane française

FT : Les Aluku de Guyane à un tournant: de l'économie de subsistance à la société de consommation

AU : DELPECH (B.)

SO : Cahiers d'Outre-Mer (Les); ISSN 0373-5834; France; Da. 1993; Vol. 46; No. 182; Pp. 175-193; Abs. français/anglais; Bibl. 32 ref.; 1 carte

FA : Les Aluku, installés dans la région de Maripasoula, bassin supérieur du Maroni, vivaient de salariat sur les chantiers côtiers, d'auto-production de pirogues et de services liés au transport

fluvial et d'activités de subsistance. La départementalisation en 1969 a inclus le pays aluku dans la planification, exposant les populations régies par un système coutumier à l'influence de la société occidentalisée, du passage des touristes, au changement social. La scolarité obligatoire n'est pas toujours bien adaptée et contrarie le genre de vie basé sur l'économie de subsistance. - (REGARDS)

FD : Société traditionnelle; Changement social; Conditions de vie; Identité culturelle; Groupe ethnique; Malnutrition; Ethnie; Guyane française

FT : Décomposition géochimique des hydrogrammes de crue (bassins versants de la piste Saint-Elie, Guyane)

AU : BARIAC (T.); MILLET (A.); LADOUCHE (B.); MATHIEU (R.); GRIMALDI (C.); GRIMALDI (M.); SARRAZIN (M.); HUBERT (P.); MOLICOVA (H.); BRUCKLER (L.); BERTUZZI (P.); BES (B.); GAUDU (J.C.); HOROYAN (J.); BOULEGUE (J.); JUNG (F.); BONELL (M.); BALEK (J.); BRUNET (Y.); BONNEFOND (J.M.); TOURNEBIZE (R.); GRANIER (A.); OLIVRY (J.-C.)

SO : Collection Colloques et Séminaires; ISSN 0767-2896; France; Da. 1995; Pp. 485-505; Bibl. 16 ref.; 25 fig.

FA : Cette étude montre l'intérêt de l'utilisation conjointe des informations chimiques, isotopiques et tensiométriques pour la séparation des hydrogrammes de crue. L'analyse des crues par la méthodologie isotopique met en évidence l'existence, à l'exutoire, d'un mélange d'eaux issues de la pluie et des différentes couches du sol. L'utilisation de traceurs chimiques est indispensable à la caractérisation du l'eau du réservoir sol

FD : Bassin-versant; Géochimie; Crue; Analyse isotopique; Hydrochimie; Ecoulement; Cycle de l'eau; Zone intertropicale; Guyane française

FT : Les effets hydrologiques du déboisement de la forêt amazonienne et d'utilisations alternatives du sol

AU : FRITSCH (J.-M.); OLIVRY (J.-C.)

SO : Collection Colloques et Séminaires; ISSN 0767-2896; France; Da. 1995; Pp. 411-424; Bibl. 12 ref.; 8 fig., 7 tabl.

FA : Différentes expérimentations ont été réalisées (de 1977 à 1987) à diverses échelles pour caractériser et quantifier les effets d'un déboisement mécanisé de la forêt amazonienne et de différentes utilisations du sol correspondant à des scénarios de développement, qui auraient été implantés après la coupe. 10 petits bassins-versants ont été sélectionnés. Mise en évidence des effets des traitements sur les régimes hydrologiques (apports, débits de crue) ainsi que sur l'érosion des sols

FD : Zone intertropicale; Déboisement; Expérimentation; Utilisation du sol; Régime hydrique; Eau du sol; Ecoulement; Utilisation agricole du sol; Défrichement; Forêt; Bassin-versant; Guyane française

FT : Variations saisonnières et flux de quelques éléments majeurs dans trois rivières de Guyane française

AU : LOINTIER (M.); OLIVRY (J.-C.)

SO : Collection Colloques et Séminaires; ISSN 0767-2896; France; Da. 1995; Pp. 391-410; Abs. français; Bibl. 27 ref.; 16 fig., 7 tabl.

FA : Les mesures systématiques pratiquées de juillet 1989 à juillet 1991 sur rivières de Guyane (Comté, Lawa et Oyapock) ont permis de comparer les variations de contenus en matières en suspension et les variations de concentrations en calcium, chlorures et silice dissoute selon l'hydraulicité et le facteur d'échelle (surface du bassin). Les 3 bassins-versants appartiennent au milieu tropical forestier humide

FD : Zone intertropicale; Forêt; Géologie régionale; Régime hydrologique; Débit; Ecoulement

fluvial; Charge en suspension; Charge en solution; Hydrodynamique; Transport solide; Hydrochimie; Géochimie; Ecoulement; Charge solide; Guyane française

FT : Occupation des sols et régimes hydrologiques: les enseignements de bassins versants guyanais

AU : FRITSCH (J.-M.); GODARD (A.)

SO : Annales de géographie; ISSN 0003-4010; France; Da. 1995; Vol. 104; No. 581-582; Pp. 26-63; Abs. français/anglais; Bibl. 42 ref.; 11 fig., 10 tabl.

FA : En s'appuyant sur des études de cas tirées du programme Ecérex en Guyane française, l'A. montre que selon le bassin versant et selon le paramètre hydrologique considéré (écoulement annuel, pointe de crue), les effets hydrologiques des manipulations du couvert végétal (déboisement, reboisement, conversion de forêt en prairie, etc.), peuvent dans certains cas être évalués avec précision, mais que dans d'autres cas l'incertitude est beaucoup plus grande et qu'il y a présomption hydrologique plutôt que preuve scientifique

FD : Bassin-versant; Expérimentation; Etude d'impact; Régime hydrologique; Hydrologie; Crue; Déboisement; Forêt tropicale; Utilisation du sol; Couverture végétale; Zone intertropicale; Guyane française

FT : L'agriculture en Guyane française

AU : BOULBES (D. C.)

SO : Géographie et recherche; ISSN 0184-7589; France; Da. 1993; No. 85; Pp. 49-72; Bibl. 10 réf.; 3 fig.

FA : La Guyane, après avoir longtemps fonctionné repliée sur elle-même, a fait l'objet d'une politique de développement rural impulsée par la métropole à partir de 1976. Cependant, les conditions naturelles limitent la mise en valeur agricole, qui s'annonce difficile. Avant d'examiner les diverses phases de la politique entreprise, l'A. dresse le tableau de l'agriculture en 1975. L'accent est mis sur les programmes intégrés d'aménagement rural, et sur le succès de communautés asiatiques dans le développement du maraîchage

FD : Agriculture; Mise en valeur; Développement rural; Milieu naturel; Peuplement; Elevage; Economie rurale; Production agricole; Guyane française

FT : Le cacaoyer en Guyane française

AU : BERAU (M.); LACHENAUD (P. E.); PLANQUETTE (P.); MONNIER (Y.); HUETZ DE LEMPS (A.)

SO : Cahiers d'Outre-Mer (Les); ISSN 0045-3765; France; Da. 1992; Vol. 45; No. 179-180; Pp. 349-356; Abs. FRE/ENG; Bibl. 6 réf.; 9 phot.

FA : Bref historique des plantations de cacaoyers en Guyane française et commentaire illustré de la fabrication artisanale du « chocolat pays » ou « bâton cacao ».- (OC)

FD : Produit agricole; Cacao; Artisanat; Produit alimentaire; Agriculture; Guyane française

FT : Mise en valeur de l'écosystème forestier guyanais. Opération ECEREX

AU : SARRAILH (J. M.)

SO : Mise en valeur de l'écosystème forestier guyanais. Opération ECEREX; France; Paris, Nogent-sur-Marne; Institut National de la Recherche Agronomique; Da. 1990; Pp. 273 p.; ISBN 2-7380-0191-2

FA : L'opération ECEREX, mise en place par différents organismes de recherches, est née de la volonté de développer la Guyane Française par l'exploitation de la forêt dense humide naturelle à des fins papetières. Une approche pluridisciplinaire a permis : l'évaluation des risques écologiques que présente cette exploitation passant par une déforestation totale (érosion, modification des régimes hydrologiques, baisse de productivité, dégradations biologiques); la proposition de modèles d'aménagement et la définition des techniques nécessaires à l'implantation d'écosystèmes simplifiés, après l'exploitation papetière.- (L'A.)

FD : Forêt; Ecosystème; Mise en valeur; Zone intertropicale; Sol; Bassin-versant; Erosion;

Ruissellement; Expérimentation de terrain; Sylviculture; Cycle biogéochimique; Exploitation forestière; Forêt tropicale; Aménagement rural; Dynamique de la végétation; Cycle de l'eau; Agrosystème; Méthodologie; Aménagement forestier; Dégradation biologique; Eau du sol; Guyane française

RÉSUMÉS

La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la Bibliographie Géographique Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS, <http://www.inist.fr>). Pour cette rubrique, l'interrogation a été faite sur les années 1993 à 2008 avec le descripteur « Guyane française ».